

# THERMIDOR (B)

## DER FRÜHE PONDOR!

- ✓ sehr früher Weizen mit schneller Schlussabreife
- ✓ 2-jährige Spitzenerträge in F und DE
- ✓ hervorragende Fusariumtoleranz
- ✓ CTU-Tolerant
- ✓ hervorragende Stoppelweizeneignung
- ✓ gute Grundgesundheit

### SORTENEIGENSCHAFTEN

|                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| Ährenschieben    | 3 | früh            |
| Reife            | 3 | früh            |
| Pflanzenlänge    | 4 | kurz - mittel   |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |
| Auswinterung     | - |                 |

### KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT

|               |   |                    |
|---------------|---|--------------------|
| Halmbruch     | 2 | gering-sehr gering |
| Mehltau       | 4 | gering - mittel    |
| Blattseptoria | 2 | gering-sehr gering |
| DTR*          | 4 | gering - mittel    |
| Gelbrost      | 3 | gering             |
| Braunrost     | 5 | mittel             |
| Ährenfusarium | 4 | gering - mittel    |

### ERTRAGSEIGENSCHAFTEN

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Bestandesdichte*   | 5 | mittel           |
| Kornzahl / Ähre*   | 7 | hoch             |
| Tausendkornmasse   | 4 | gering - mittel  |
| Kornertrag Stufe 1 | 8 | hoch - sehr hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 9 | sehr hoch        |

\*Züchtereinstufung

### QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| Hektolitergewicht  | 6 | mittel - hoch |
| Fallzahl           | 7 | hoch          |
| FZ-Stabilität      | - | -             |
| Rohproteingehalt   | 3 | gering        |
| Sedimentationswert | 6 | mittel - hoch |

